

FICHE FHI DE CONSULTATION RAPIDE

pour les Critères de recevabilité médicale de l'OMS

pour l'adoption des méthodes contraceptives suivantes :
Contraceptifs oraux combinés (COC), Noristerat (NET-EN), Depo Provera (DMPA), Dispositifs intra-utérins au cuivre (Cu-DIU)

		COC	NET-EN/DMPA	Cu-DIU			COC	NET-EN/DMPA	Cu-DIU
Age	De la ménarche jusqu'à 39 ans				Hyperlipidémie avérée				
	40 ans ou plus				Cancer	Col utérin			
	De la ménarche jusqu'à 17 ans					Endomètre			
	De 18 à 45 ans					Ovaire			
	Plus de 45 ans				Maladie du sein	Grosseur non diagnostiquée			
Nulliparité	Moins de 20 ans					Antécédents familiaux de cancer			
	20 ans ou plus					Cancer actuel			
Allaitement naturel	Moins de 6 semaines du post-partum			*	Fibrome utérin				
	De 6 semaines à 6 mois du post-partum				Endométriose				
	6 mois ou plus du post-partum				Maladie trophoblastique				
Tabagisme	Age < 35 ans				Saignements vaginaux	Irréguliers, peu prononcés			
	Age ≥ 35 ans, moins de 15 cigarettes par jour					Prononcés ou prolongés, réguliers ou non			
	Age ≥ 35 ans, 15 cigarettes ou plus par jour					Inexpliqués			
Hypertension	Antécédents d'hypertension avec pression artérielle NE POUVANT PAS être mesurée				Cirrhose	Légère			
	Contrôlée et POUVANT être mesurée					Grave			
	Systolique 140-159 ou diastolique 90-99				Affection des voies biliaires actuelle et symptomatique				
	Systolique ≥ 160 ou diastolique ≥ 100				Cholestase	En rapport avec la grossesse			
Céphalées	Autres que migraines. Légères ou graves.					Liée à l'emploi de CO			
	Migraines sans symptômes neurologiques focaux				Hépatite	Evolutive			
	Age < 35 ans					Sujet porteur			
	Age ≥ 35 ans				Tumeur du foie				
	Migraines avec symptômes neurologiques focaux				IST/MIP	Actuelle ou au cours des 3 derniers mois			
						Risque accru d'IST			
	Antécédents de thrombose veineuse profonde				VIH/SIDA				
	Thrombophlébite superficielle				Anémie ferriprive				
	Valvulopathie cardiaque avec complications				Paludisme				
	Cardiopathie ischémique/accident cérébro-vasculaire (attaque)				Tuberculose non pelvienne				
Diabète	Maladie non vasculaire				Maladie thyroïdienne				
	Maladie vasculaire ou diabète durant plus de 20 ans				Interactions :	Rifampicine, griséofulvine, certains anticonvulsants			
						Autres antibiotiques			

Catégorie 1 *Aucune* restriction d'emploi. Catégorie 3 En général, emploi *déconseillé*. Emploi possible si le prestataire possède des compétences cliniques et s'il y a accès à des services cliniques.
 Catégorie 2 En général, emploi possible de la méthode. Catégorie 4 Méthode à *proscrire*.

* Le port du DIU par les femmes en post-partum, qu'elles allaitent ou non, est de Catégorie 2 jusqu'à 48 heures après l'accouchement, de Catégorie 3 de 48 heures jusqu'à 4 semaines après l'accouchement, et de Catégorie 1 au-delà de 4 semaines.
 Source : Adapté de *Pour un meilleur accès à des soins de qualité en matière de planification familiale : Critères de recevabilité médicale pour l'adoption et l'utilisation continue de méthodes contraceptives*. Genève : Organisation mondiale de la Santé. Deuxième édition (en anglais), 2000.

