

## VI. Dispositivos Intra-Uterinos que Contêm Cobre

Esta seção apresenta as recomendações para as seguintes questões de atendimento para dispositivos uterinos que contêm cobre (DIU):

1. Quando é que um DIU pode ser **inserido (intervalo)**?
2. Quando é que o DIU pode ser inserido no **pós-parto**?
3. O DIU pode ser **inserido imediatamente pós-aborto**?
4. Qual é um **cronograma de seguimento apropriado** depois da inserção do DIU?
5. Existe a necessidade de um **pré-exame de rotina** (visita especial) antes da inserção do DIU?
6. Existe uma idade **mínima** ou **máxima** para colocar o DIU?
7. **Mulheres sem filhos** (nulíparas) podem receber o DIU?
8. a) Existe uma necessidade para um **período de descanso** depois de um certo período de uso?  
b) Existem razões clínicas para remoção de um DIU?
9. Depois da remoção de um DIU (por razões de expulsão parcial sem infecção, o **u vencimento** de prazo do DIU), deve-se **esperar para inserir** outro?
10. Se uma mulher está em baixo risco de DST, baseado na sua história clínica, os DIU podem ser **inseridos sem quaisquer testes de laboratório** se não constar corrimento endocervical muco-purulento ou DIP ou cervicite clinicamente aparente?
11. Um DIU deve ser removido se o **parceiro reclama dos fios**?
12. Se o colo uterino está vermelho devido a eversão da juntura escamosa-colunar (**ectopia/ectoprion**), o DIU pode ser inserido sem maior investigação?
13. Se uma mulher reclama de **menstruações mais abundantes e/ou sangramento entre menstruações**, existe base clínica para remover o DIU?
14. Os DIU podem ser **inseridos** seguramente **por enfermeiras e parteiras treinadas**?
15. Quanto tempo deve passar entre o **tratamento de DST e inserção**? E com antecedentes **prévios de DST**?
16. Os DIU devem ser fornecidos se **medidas de prevenção de infecções** não podem ser seguidas?