

## Q.10. Os Implantes NORPLANT® devem ser fornecidos se medidas de prevenção de infecções não podem ser seguidas?

Recomendações	Racionalidade
<p>a) Não.</p> <p>Todos os centros que inserem e/ou removem Implantes NORPLANT® devem seguir medidas básicas para prevenção de infecções consistentemente, incluindo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• técnica asséptica (inclusive a lavagem das mãos pelo provedor e limpeza rigorosa do local de inserção);</li><li>• descontaminação apropriada de instrumentos cortantes reutilizáveis e outros instrumentos;</li><li>• esterilização (ou, no mínimo, desinfecção de alto nível) de todo equipamento, e</li><li>• a eliminação segura de instrumentos agudos contaminados e outros.</li></ul>	<p>a) Apesar de que a inserção e remoção de Implantes NORPLANT® ser procedimento de pequena cirurgia, uma técnica asséptica cuidadosa, incluindo uma correta técnica cirúrgica, precisa ser seguida para evitar um aumento de infecções no local da inserção. A infecção pode resultar e remoção precoce ou expulsão espontânea da cápsula do Implante NORPLANT®.</p> <p>Outra preocupação é o problema, cada vez maior, de transmissão dos vírus da Hepatite B e AIDS para clientes, provedores e pessoal clínico, especialmente o pessoal de limpeza. Para minimizar o risco, resíduos contaminados com sangue precisam ser eliminados corretamente e instrumentos, luvas e outros itens sujos (usados) precisam ser descontaminados, em seguida, limpos rigorosamente e então esterilizados ou desinfetados à nível depois de cada paciente.</p> <p>A esterilização (eliminação de todos os microrganismos, incluindo endosporos) é a prática preferida para o processamento de instrumentos e outros itens que entram em contato com a via sanguínea ou tecido subcutâneo. Quando a esterilização não estiver disponível, é aceitável a desinfecção de alto nível (que elimina todos os microrganismos, com exceção de alguns endosporos).</p> <p>Independentemente do método usado (esterilização ou desinfecção de alto nível) para instrumentos e outros itens, a lavagem rigorosa do braço e mão da cliente para remover sujeira e material orgânico é necessária também, para evitar infecção. Um curativo apropriado e instruções para clientes sobre higiene do local de inserção também são importantes.</p> <p>1) Tietjen L, Cronin W, McIntosh N. <i>Prevenção de Infecções para Programas de Serviços de Planejamento Familiar: Um Manual de Referência para Resolver Problemas</i>. Baltimore, JHPIEGO Corporation, 1992;14:1-4.</p>