

Anexo F

Tabela Resumida dos Critérios de Elegibilidade Médica da OMS 1996 para Iniciar o Uso de Anticoncepcionais

NOTA: Essa tabela não inclui os critérios de elegibilidade para todos os métodos cobertos no Volume II, mas a maioria dos métodos discutidos neste volume mais cada um dos métodos discutidos no Volume I.

Categorias OMS para Métodos Temporários

OMS 1 Pode usar o método. **Sem restrições de uso.**

OMS 2 Pode usar o método. **As vantagens geralmente compensam os riscos teóricos ou comprovados.** Se um médico ou enfermeiro está disponível para fazer um julgamento clínico, as condições da categoria 2 devem ser consideradas na escolha de um método. Se a usuária escolhe o método, pode ser necessário um acompanhamento maior do que usual.

OMS 3 Não deve usar o método a não ser que o médico(a) ou enfermeiro(a) faça um julgamento clínico que a usuária pode usá-lo seguramente. **Os riscos teóricos ou comprovados geralmente excedem as vantagens** do método. O método é de última escolha, para o qual monitoria regular pode ser necessária.

OMS 4 Não deve usar o método. A condição representa um **risco inaceitável à saúde** se o método for usado.

Sistema Simplificado de 2 Categorias

Quando um médico ou enfermeiro não está disponível para fazer julgamentos clínicos, o sistema de classificação OMS de 4 categorias pode ser simplificado em um sistema de 2 categorias como demonstrado nessa tabela:

Categoria OMS	Com Julgamento Clínico	Com Julgamento Clínico Limitado
1	Use o método em qualquer circunstância	Use o método
2	Geralmente use o método	Use o método
3	O uso do método não é geralmente recomendado a não ser que métodos mais apropriados não estão disponíveis ou não são aceitáveis	Não use o método
4	O método não deve ser usado	Não use o método

NOTA: Na tabela que segue, as condições da Categoria 3 e 4 são realçadas para indicar que o método não deve ser fornecido quando o julgamento clínico é limitado.

Categorias OMS para Esterilização Feminina e Vasectomia

Aceitar Nenhuma razão clínica impede realizar o procedimento em um contexto rotineiro.

Cautela O procedimento pode ser realizado em um contexto rotineiro mas com **preparação e precauções extras.**

Postergar **Postergue o procedimento.** Condição precisa ser tratada e resolvida antes da realização do procedimento. Forneça métodos temporários.

Encaminhar **Encaminhe a usuária** a um centro onde um cirurgião e pessoal com experiência possam realizar o procedimento. O ambiente deve ser equipado para anestesia geral e outro apoio clínico. Forneça métodos temporários (A OMS chama essa categoria “Especial”).

NOTA: Na tabela da página anterior, as condições “Postergar” e “Encaminhar” são realçadas.

Referências:

- 1) Hatcher RA, Rinehart W, Blackburn R, Geller JS. The essentials of contraceptive technology. Baltimore, MD: Johns Hopkins School of Public Health, Population Information Program, 1997.
- 2) World Health Organization. Improving access to quality care in family planning: medical eligibility criteria for contraceptive use. Geneva: WHO, 1996.