

12. Si el cuello uterino presenta un color rojo debido a la eversión de la unión cilíndricoescamosa (ectopia/ectropión), ¿puede insertarse el DIU sin investigación posterior alguna?

Recomendaciones	Razón fundamental
a) Sí, los DIU pueden insertarse en usuaria con una ectopia/ectropión cervical, siempre que la mujer no esté bajo riesgo de contraer una ETS y que el examen pélvico sea normal (que no haya presencia de cervicitis).	a) El ectropión cervical (presencia en el exocérnix de células del epitelio cilíndrico del endocérnix) es una condición normal en las adolescentes y en el embarazo, siendo claramente diferenciable de una infección cervical. 1) Paavonen J, Koutsky LA, Kiviat N. Cervical neoplasia and other STD-related genital and anal neoplasias, en Holmes KK, Mardh P, Sparling PF, Wiesner PJ, Cates W, Lemon SM, Stamm W (editores). <i>Sexually Transmitted Diseases</i> . Nueva York, McGraw-Hill Book Co., 1984, pp 561-592. Las inserciones y el uso continuado de los DIU no tienen relación alguna con el riesgo de carcinoma cervical. 1) Lassise DL, Savitz DA, Hamman RF, Baron AE, Brinton LA, Levines RS. Invasive cervical cancer and intrauterine device use. <i>International Journal of Epidemiology</i> 1991;20(4):865-870. Debido a que la clamidia es un parásito intracelular de las células del epitelio cilíndrico, es más probable que las mujeres con ectropión arrojen pruebas positivas para dicho microorganismo. 1) Harrison HR, Costin M, Meder JB, Bowds LM, Sim DA, Lewis M, Alexander ER. Cervical chlamydia trachomatis infection in university women: Relationship to history, contraception, ectopy and cervicitis. <i>American Journal of Obstetrics and Gynecology</i> 1985;153(3):244-51.